Fiche produit

INSECTES CHOC POLYVALENT
Prêt à l'emploi

Insectes Choc Polyvalent protège contre les insectes nuisibles au bon développement des cultures **potagères** et **florales**. Son effet choc permet résultat visible rapidement.

+ **Large spectre d'action**
+ **Action par ingestion et contact**
+ **Utilisation intérieur / extérieur**
+ **Format économique**

Référence	Présentation	Unités par carton
DECIS1	1 L	12

Composition	Deltaméthrine 0,0075 g/l
Nom homologué	DECIS AL
N°A.M.M	2100078
Formulation	AL – Formulation Prêt à l'emploi
Classement	**N** : Dangereux pour l'environnement* **R 50/53** : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique **Emploi autorisé dans les jardins**
Cultures autorisées	Chou (uniquement chou fleur, pommé, à feuille et rave), laitue, haricot, pois, rosier, cultures florales diverses, plantes d'intérieur
Indication	Insecticide

Mode d'emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Tourner l'embout pour enlever la sécurité enfant.
- Traiter dès l'apparition des insectes ou de leurs premiers dégâts.
- Pulvériser à une trentaine de centimètre de la culture en prenant soin de bien mouiller, mais sans excès, toutes les parties du végétal.

Bayer S.A.S. - Jardin, Espaces verts et Hygiène publique
16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 - F-69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 85 43 21 - Fax : 04 72 85 48 33

Cultures	Ravageurs	Dose	Application - Si nécessaire, renouveler le traitement en cas d'insectes difficiles à contrôler en respectant les intervalles entre les 2 applications
Chou (uniquement chou fleur, pommé, à feuille et rave)	Piéride du chou, teigne des crucifères, charançon de la tige, petites altises du chou	100 ml /m²	**intervalle de 7 jours** – dans la limite de **2 applications/an.**
Laitue	Noctuelles défoliatrices		**intervalle de 7 jours** – dans la limite de **3 applications/an.**
Haricot	Pucerons, pyrale du maïs, sitone		**intervalle de 14 jours** – dans la limite de **2 applications/an.**
Pois	Sitones		
Rosiers, cultures florales diverses	Pucerons, noctuelles défoliatrices		**intervalle de 7 jours** – dans la limite de **5 applications/an.**
Plantes d'intérieurs	Pucerons, aleurodes, noctuelles défoliatrices, coléoptères		
Toutes espèces florales	Coléoptères		

- Respecter un délai avant récolte de 7 jours sur l'ensemble des cultures sauf sur laitue sous abris 14 jours.
- Il est possible de voir apparaître de légères nécroses et taches de décoloration sur les feuilles ou les fleurs des rosiers ou autres cultures florales lors de l'application de la préparation.

Précautions d'emploi

Porter des gants pendant toutes les phases d'utilisation du produit.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer.

- **Lors de l'application :**

Ne pas traiter en présence d'abeilles. Attention ce produit peut porter atteinte à la faune auxiliaire.
Ne traiter qu'en cas de nécessité.
Ne pas traiter par temps venté ou par forte chaleur.
Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseaux, étangs, mares, puits… en particulier si le terrain est en pente.

- **Après l'application :**

Délai de rentrée : attendre le séchage complet des plantes traitées ou de la zone traitée
Conserver le produit dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, entre 0°C et 40°C.
Eliminer les produits non utilisables dans une déchèterie et les emballages vides dans la poubelle ménagère.

** Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.*

Bayer S.A.S. - Jardin, Espaces verts et Hygiène publique
16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 - F-69266 Lyon Cedex 09
Tél. : 04 72 85 43 21 - Fax : 04 72 85 48 33